

使用降血糖針劑病人照護安全

林口長庚紀念醫院 賀倫惠



107~108年度醫院病人安全目標五

- ●加強使用高警訊藥品病人的照護安全
 - ○化學治療藥品
 - ○抗凝血劑
 - ○降血糖針劑
 - ○類鴉片止痛藥品

用藥安全病安目標建議作法1-1

- 醫療人員針對降血糖藥品應避免以「口頭」 溝通血糖值,應有標準化程序通報並回應 血糖檢測結果及後續醫療照護流程
- 2.3.3為確保護理人員正確給藥,建議給藥 系統應設置提示畫面,如:以顏色或特殊 標示辨別高警訊藥品

用藥安全病安目標建議作法1-2

- 使用降血糖針劑建議
 - ○應註記胰島素施打部位,如:有顏色標註已注射 區塊或自動提醒應施打部位,以避免施打重覆部 位




高警訊藥品管理

為保障病人用藥安全,針對因使用錯誤導致嚴重 後果之特殊藥品制定管理原則,分為危險藥品及 高警訊藥品。


針對特殊藥品制定管理原則,包括:藥品存放、 處方單及給藥單藥袋標示、定期查核等等。





高警訊藥品

首頁>部門網頁>其他專科>藥劑部>最新消息>高警訊藥品公告



本院高警訊藥品範圍

首頁→部門網頁→其他專科→藥劑部→常用資料→高警訊藥品

項次	藥品編號	藥名	備註
一.高濃縮電解質液			
1	PIG024P	NaCl 3%,500ml/bot	
2	PZA019P	NaCl 23.5%, 200ml/bot	
3	PIG040P	Potassium chloride (ivf) 15%,20meq/10ml	
4	PIG054P	Pot. Phosphate 20ml/amp	
二.Heparin			
5	PLC004P	Heparin sodium 25000u/5ml/vial	
三.Insulin			
6	PME032P	Hm actrapid(hm R) 100u/ml,10ml/vial	
7	PME034P	Insulatard HM 100u/ml,10ml/vial	
8	PME042P	Insulin glargine 100iu/ml,10ml/vial	
9	PME044P	Insulin glargine 100iu/ml, 3ml/optiset	
10	PME056P	NovoMix 30 100U/ml,3ml/penfill	
11	PME058P	Insulin Aspart 100u/ml,3ml/penfill	
12	PME062P	Insulin detemir 300u/3ml/預填式注射筆	
13	PME076P	Humalog Mix50, 100IU/ml, 3ml/cartridge	
14	PME088P	Humalog Mix25, 100IU/ml, 3ml/cartridge	
15	PME113P	Insulin GLULISINE (Apidra) 100IU/ml,3ml/pen	
16	PME107P	Insulin Lispro 100iu/ml,3ml/penfill	
17	PME114P	NovoMix 50 penfill 100U/ml,3ml/pc	
18	PME118P	Insulin Aspart penfill 100u/ml,3ml/pen	新增

危險藥品/高警訊藥品全院標示一致化

• 危險藥品:以淺紅色底黑字標示


學 名:Lorazepam 商品名:Anxiedin 劑 量:2 mg/ml/ap

設 定 量:2 pc 管制等級:4

•高警訊藥品:以淺紅色底黑字加註炸彈



單支逐一標示



商品名:Actrapid

劑 量:100iu/ml,10ml/vial 設定量:2 pc 管制等級:--



高警訊藥品-存放

高警訊藥品與一般藥品分開放置



不同高警訊藥物需分開放置



藥物管理注意事項

藥品儲存環境包括:急救車、常備藥櫃、管制藥櫃 每月至少清潔一次

•藥品儲存溫度:正常範為15-30度

冷藏藥物保持2-8度

•高濃縮電解質固定位置並與其他藥物分隔上鎖存放








冰存藥品

使用藥物注意事項

- 特殊的藥物—如:胰島素、免疫力球蛋白...等,須放在冰箱冷藏室(2-8度),未冷藏保存,易降低藥物功效,甚至發生變質。誤放入冷凍室,易導致藥品結冰,影響藥效,或藥瓶凍裂而不能再用
- 請注意標示(藥袋)
- 運送過程以保冷袋維持溫度

藥名	外觀				
Cisatracurium 2mg/ml,5ml/amp	BOSETTOTES BUSINESS LAND				
Insulin glargine (Lantus SoloStar) 10	Service 3-fg/feet				
Regular HM insulin 100iu/ml,10ml/vial	Security of the second of the				
Epoetin beta 2000iu/0.3ml(pre-filled	Recormon 学可要*				
Anidulafungin 100mg/vial	Total Control of the				



使用藥物注意事項

維護用藥安確保已開封藥品藥效、效期、剩餘量或避免退藥異常,落實3步驟





須於藥品上標註(註明床號、姓名、病歷號碼、開瓶起訖日期及時間)·若為粉劑則需註明稀釋總量、每cc劑量、有效日期及時間,並簽(章)上姓名



開封後需移除外包裝(含:紙盒、原裝外袋等),口服錠劑類需先放入夾鍊袋後才能再放回藥袋(籤)內



退藥時需確實逐一檢視包裝完整性

新藥品引進上線前網頁公告





中華民國106年0


行政中心 藥材管理部藥品通告

說明

- 1. 本院藥品PME107P Insulin Lispro KwikPen 100iu/ml,3ml /pen(Humalog Mix25 KwikPen)合約廠商通知產品外觀變更,產品新舊外觀如附件
- 2. 實際變更時間以院區舊品用罄為準,敬請給藥時特別注意!

行政中心 藥材管理部 啟





藥劑網頁公告外觀易混淆藥品

林口長庚紀念醫院 藥劑部

Linkou Chang Guang Memorial Hospital Department of Pharmacy Administratio

藥材管理部 基隆藥劑科 台北藥劑組 林口藥劑科 桃園藥劑組 嘉義藥劑科 高雄藥劑科

首頁 部門介紹 藥品資訊 出版刊物 規章及表單 評鑑專區 資料統計 友善連結



外觀易混淆的藥品

年度	第一季	第二季	第三季	第四季
107年				
106年	(((1)	(
100年	\wedge	\wedge	\wedge	\wedge



	_											_			
總頁業	£:29													頁數:	29-9
項次	操	作	說	明	或	作	業	流	程		注	意	事	項	
煮	胰岛素注射	法													
	一、執行前									確認病人	. 已備妥餐器	b,準備進食	,方可注射	, 以避免病,	人注射後
										無法立即	進食導致血	1糟過低。			
	(一)同肌肉]、皮1	F、皮	内注!	射法(·	-)~(z	☆)。			檢查胰島	素有無過期	月(瓶身應標示:	有效期限):	、沉澱 、變色	、雜質、
										结霜或其	<u>他</u> 變化,a	苦有 問題應停用	4 .		
	(二)由冰箱	取出角	斤需注	射之	胰岛素	,將	築物放	於手	掌間搓揉	数 I. Regula	ar HM insulii	n - NPH huma	n insulin 儲	存於醫療用:	水箱中冷
	次,使	薬物区	可温或	混合	均勻。					藏(2℃	[-8℃],未爲	昇封則依藥品核	累示存放。篇	封後保存期	限 42 天,
										胰島素	·瓶身 <mark>贴上</mark> #	票籤贴纸;註明展	胃瓶起芘日	、時間及人員	簽章。
										2. 遊免用	力摇晃蘩荆	五,以減少發生	上結霜情形	8	
	(三)單一種	類之朋	夷島素	抽取											
	1. 取出	胰岛素	全爱才	空針的	🐧 Рег	Nee d)	le" 撘	配使月	1(國一)	. 1. 單一和	重類之"一意	点成形" 筆型朋	氨素型態	,如:蘭德伯	任注射筆
										(Lant	us®)、瑞和	密爾諾易筆(FlexPen®	·Levemir®)	,一定要
						-		-	0.0	搭配"	Pen Nee dl e	e" 使用(圖 二~!	圈三)。		
	Continue	Bo 27	1 N N	3	-	6	A								
				- 5				BIN	-	m/8****	***		ADDRESS OF THE PARTY NAMED IN		No.
										off III	DIE .		A District		
					№	-									
											圖 二			過三	
										2. 需要更	換"Penfil!	【藥水" 之筆型	胰岛素型態	,如:諾和斯	%®、 <u>蹉芯</u>
										🏂® №	ovoRapid® र	「搭配胰岛素妥	"全空針或"	Pen Nee dl e"	使用(圖
										四)。					

制定日期:75 年05 月 修訂日期:107 年 06 月

												<		
剪貼簿	īg.			字	型			L2		段落		Fg.		模式
美贝 经	L • 42													貝-数・40-10
項次	操	作	說	明	或	作	業	流	程		注	意	事	項
											15 12	policy in the second		
	2. 以 7.	5%.酒煮	棉枝	東內名	主外環	形消-	泰胰点	素藥	瓶橡皮塞,	抽取"Penfi	[]] 藥水	" 辟,直接抽取	藥水即可,	· 勿 <u>以空針抽取</u> 所需注
		乾燥								射等量的空	. 魚後打り	入藥瓶內。		
	3. <u>以空</u>	針抽耳	放所需	注射:	等量的	空氣征	复打入	藥瓶	內,倒置藥莊					
	抽出	所需注	主射的	劑量	e									
	(四)混合之	胰島	素抽取	Į.										

1. 取出胰岛素安全空針或"Pen Needle"搭配使用。

 "一體成形"筆型胰島素,優泌樂筆 混合型 25 100 單位/毫升 (Humalog Mix25 100U/ml KwikPen)、優泌樂筆 混合型 50 100 單位/毫升 (Humalog Mix50 100U/ml KwikPen)一定要搭配"PenNeedle"使用(圖五)。





圖五

圈六

需要更換"Penfill 藥水"之筆型胰島素,如:諾和密斯 30® 諾芯管® NovoMix®30 可搭配胰島素安全空針或"Pen Needle"使用(圖六)。

劉定日期:75 年 N5 日 | 條計日期: 107 年 N6 日 第十五 少條計

編號: N11028

頁數:29-11

總頁數:29

項次 操 說 業 流 作 明 或 作 程

津 奇 寠 項

- 2. 以 75%酒積棉枝由內往外環形消毒胰島素藥瓶橡皮塞,待 其乾燥。
- 3. 先以空針抽取所需注射之中長效胰島素等量的空氣,藥瓶 **雷正放於桌面後,打入藥瓶內針尖不可觸及液面。**
- 4. 將空針抽出。
- 5. 再以空針抽取所需注射短效胰岛素等量的空氣後,打入藥 | 短效胰岛素注射液為清澈性質,中長效胰岛素注射液為混濁性 瓶內。
- 6. 倒置短效胰島素藥瓶,隨即抽出所需注射的劑量。
- 7. 抽出空針,插入混濁藥瓶,倒置長效胰島素藥瓶抽出所需 注射胰岛素的劑量。
- 8. 抽出空針後平立單手回蓋,將空針置於兩掌間搓揉以混可減輕冰冷胰島素注射後的疼痛。 匀胰岛素。

動 10 次,直到藥水呈現均勻白霧狀,使胰島素能回溫及混合均 自。若注射前未確實執行藥品混合動作,而致藥物混合不均, 易影響病人血糖值,產生高低血糖的風險及注射時發生藥物阻 塞等現象。

使用預混型胰岛素注射筆,需以合掌滾動筆針 10次,再上下擺

(質蘭德任注射筆是清澈的長效性胰島素Lantus®)。

2 抽藥時必須先抽短效胰島素,再抽中長效胰島素,可避免短效 胰岛素溶液遭受中長效胰岛素溶液混合,而影響短效胰岛素之 藥效。

- 二、執行中
- 一)選擇注射部位,依 AI-BI-CI-DI-EI-FI-GI-HI 的方向輪換|如該部位有傷口或醫屬肢體禁作治療,應避免注射,依序輪換下|

の何う元・ MIIULO 息頁數:29 頁數:29-12 贪 宯 項次 作 流 程 注 或 項 (二)協助病人露出注射部位。 (三)用 75%酒精機技由內往外環形消毒注射部位直徑 5-7 公對酒精過敏者則以水溶性優碘取代。 分,待完全乾燥才執行注射。 (四)採用皮下注射法執行注射。 同皮下注射注意享項。 (五)一手固定空針,另一手接針心將藥液緩緩注入。 1. 注射後勿按壓或運動,以免藥物吸收過快,造成低血糖症狀發生 2. 指导病人注射短效胰岛素 15-30 分鐘後方可逸食;途效型胰岛青 注射5分鐘後即可逸食。 使用Pen Needle 注射藥物,劑量注射完停留15秒才抽出針頭, 以防藥物滲出。 (六)注射完畢一手持無齒格枝按壓注射部位,迅速抽出針頭, 再以棉枝接住注射部位。 (七)注射後胰岛素安全空針,啟動安全裝置,依生物醫療廢棄 物分類處理。 三、執行後 (一)病人及用物整理與洗手,同肌肉、皮下、皮內注射(一) ~(=)· (二)記錄。 1. 記錄注射部位是否有紅腫或異常情况及病人反應。 |2. 於胰島素注射記錄表內記錄注射日期、時間、藥名、劑量、注象 部位及注射者。 1. 常規胰島素注射是由電腦緊獨輸入藥物並自動帶入空針數量,不 (三)完成計價作業。 須額外計價。 不規則用藥(加於 IVF 點滴灌注者)須再另計價。

制定日期: 75 年 05 月 | 修訂日期: 107 年 06 月 第十九次修訂

照護端儀器設備管理

長康翳療財團法人

規則編號

L02A03

照護端檢驗管理辦法

Home.

組織介紹

組織機能

護理特色

委員會區

教育訓練

學習分享

榮譽獎項

護理創新

活動蔥影

宙用寶典

管理規章

辦事細則

護理行政業務 手冊

- ◆ 臨床護理倫理諮詢管道
- 1 醫學倫理委員會每月諮詢專人
- 2 護理倫理意見信箱
- ◆ 護生知識網
- 1 醫學術語
- 2 常見檢驗 3 常見檢查
- 4 感染管制與安全防護
- 5 護理倫理與病人隱私
- 6 預防跌倒標準作業
- 7 洗手技術
- 8 病人辨識
- 9 血壓監測器
- 10 測量血糖
- 11 給藥技術
- 12 肌肉注射標準作業
- 13 鼻胃管護理
- 14 會陰沖洗



血糖機介紹:

ODES 3000醫用連線血糖測試儀















血糖機操作步驟

四、將血糖測試儀插上USB連 接線,透過連線電腦可將 病人血糖測量結果自動上 傳。上傳前請先關機。



藥囑開立至病人用藥流程



作業簡圖

醫師藥囑篇


醫師藥囑開立1-1




醫師藥囑開立1-2

長庚紀念醫院 住院病歴電	世論 ▼2.9			_
檢驗報告 檢查報告				
病歷號	姓名	性別	年齢	
○ Admission Note ○ 中醫入院紀錄 ○ Progress Note ○ Op-Record ○ Op-Note ○ 問題導向表(彙總) ○ Discharge Summary ● 醫囑單 ○ 出院影斷彙總表	⊕2018/07/06 2131 ⊕2018/07/06 2116 ⊕2018/07/06 1405 ⊕2018/07/06 1252 ⊕2018/07/06 1241 ⊕2018/07/06 1051 ⊕2018/07/06 1031 ⊕2018/07/05 1522 ⊕2018/07/05 1359	2 ○ 住院醫囑明組 3 ○ 會診記錄 4 ○ 癌症治療計量 5 ○ 教學記錄 6 ○ 住院診療計量 7 ○ 出院計量紀針 ○ 已交付出院額	田 ○ 中藥藥品 ○ 營養治療 計 ○ 診斷證明書 ○ 診療病情說明 計 計 分	完區: 林□ ▼ 重新連線 複製
○交接班紀錄	1935	一	条集總	離開
類別 薬品名稱	7041-	■ 用法 販前後 途徑 數量 流速	_	住院病患 清單查詢
DC-I Regular HM insulin NEW Metformin 500mg/ta		N TID AC SC 7天 TID CC PU 7天		教學紀錄 查詢
醫師:	(,G61331)	執行護師: 時間:		醫療圖像
			V	

醫師藥囑開立1-3






因應TPN血糖控制醫囑

□個人

昭護床位變更



工作清單

護理指導 紀錄與計價 其他作業 電子病歷 病歷首頁 電子病歷總 會診病歷 檢驗報告 檢查報告 NST報告查詢 PACS影像 醫療圖像 動態心電圖 台北靜態心 林口靜態心 護理記錄 癌症治療計 團隊照護 跨團隊紀錄 報表查詢


品質監控

功能表


須通知醫師機制

面對有疑慮醫囑時處理

護理人員處理醫囑有 疑慮時可作線上醫囑 退回之處理




會提示醫師哪病床醫 囑有疑慮,需再重新 做醫囑再確認處理



護理給藥篇

護理給藥操作步驟123

- Barcode Reader讀取人員條碼
- 2. Barcode Reader讀取病患手圈條碼
- 3. Barcode Reader讀取藥袋條碼或針劑條 碼



護理給藥作業系統1-1

🛐 長庚紀念醫院 護理給藥作業 - [2018/07/09版本:2018.05.04]		
住院給藥 ▼ 6 給藥 ○ 查詢 訊息列 查詢完畢!	全職開 給藥資訊 12:55	
IDS*****0185 核對ID 病歷號		-
*# 6th by o 6th 1 Mark 1 Mileston		
護剛馬り德/護塔 核野護師 藥袋號		
床位[L12F1205B] 病歷號	CM 體重 44.95K 年齡 57 生日 生日	IV P
過敏史病患自述無過敏史、	PIN V 器音 語卡機 G	60 c /r=/r
		一般 🕻 健保
	單位途徑頻率/流速 給藥時段	注意事項 P
20180706 非時段 PC Janumet(Sitagliptin 50mg + Metformin 500mg)/tab	1 PO BID 圖 18 09	9 [!!]注意低 ▲ 血糖症狀
	PC 配VV	≤,跌
20180705 非時段 PC Valsartan 160mg/f.c tab	1 PO QD 圖 09	≥
NEW	PC 配V	≤
20180705 非時段AC Esomeprazole mups 40mg/tab	1 PO QD 窗 07	≥ 勿壓碎可泡 水請立即使
(Nexium, AstraZeneca)	PC 配V	≤ 用""
20180704 非時段 Cefazolin sodium 1GM/vial	1 IV Q8H 圖 17 01 09	2
REN ·	PC 配VVV	≤
20180704 非時段 AC NPH human insulin	12 SC HS 圖 21	≥警 [!!]注 意低血糖症
REN 100iu/ml,10ml/vial	W 配 V	≤ 狀
20180704 非時段PC Atorvastatin 10mg/tab(Lipitor,	1 PO QD 圖 09	2
Pfizer)	PC	≤
20180704 非時段AC Aspirin 100mg/cap	1 PO QD 富 07	≥ 勿壓碎可泡 水請立即使
REN	PC 邮 V IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	≤開業がは

護理給藥作業系統1-2


長庆紀念醫院 護理結樂作業 - [2018/07/09版本:2018.05.04]			
(₩)			
住院給藥 ▼ 6 給藥 6 查詢 訊息列查詢完畢!	離開	<u>給藥資訊</u>	
IDS*****0185 核對ID 病歷號	存檔	1 00 154/06	, 1
護師馬〇德/護理 核對護師 藥袋號		床位:L12F12U5B	•
床位[L12F1205B] 病歷號 姓名	CM <u>體重</u> 44.	.95K 年齢 57 生日	IV P
過敏史病患自述無過敏史、	PIN	☑ 簽章 讀卡機	⊙ 一般 ○ 健保
	單位途徑頻率		注意事項 P
20180706 非時段 PC Janumet(Sitagliptin 50mg + Metformin 500mg)/tab	1 PO BID	高 18 09	2 [!!]注意低 ▲ 血糖症狀 ≤ ,跌
20180705 非時段PC Valsartan 160mg/f.c tab	1 PO QD		
NEW Varsartan roomg/r.c tab	PC PD		2
2018 <u>0705</u> 非時段AC Esomeprazole mups 40mg/tab	1 PO QD	窗 07	> > ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ②
CHG (Nexium, AstraZeneca)	PC	配	≤ A H T T T T T T T T T T T T T T T T T T
20180704 非時段 Cefazolin sodium 1GM/vial			2
REN ·	PC	配 V V V I I I	≤
20180704 非時段AC NPH human insulin	12 SC HS	富 21	≥ ≝ [!!]注 意低血糖症
REN 100iu/ml,10ml/vial	UN	ob V	<u>≤</u> 狀
20180704 非時段PC Atorvastatin 10mg/tab(Lipitor, Pfizer)	1 PO QD	圖 09	2
Table 1	PC	配 V	≤ And Institute and the
20180704 非時段AC Aspirin 100mg/cap	1 PO QD	富 07	≥ 勿壓碎可泡 水請立即使
REN	PC	配	≤ 用

護理給藥作業系統1-3


 3 長庚紀念聲院 護理給資作業 - [2018/07/09版本:2018.05.04] 3 視窗(W) 		https://www.cgmh.org.tw/sto O + A C
住院給藥	離開 給藥資訊 ●配置:使用中室溫(30℃以下)6週(避光) ▲ ●稀釋: ●注意事項:	權賞(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 説明
床位[12F1202B]病歷號[姓名	CM 體重76.2KG 年齢83.5 生日1935/01/10 IV P PIN	查詢結果 查詢的關鍵字為: PME062P
20180707 非時段PC Cold cap(Acetaminophen 300mg NEW (自費使用) +Phenylephrine 5mg+etc cap)	單位途徑頻率/流速 給藥時段 注意事項 P 1 PO TID 圖 18 09 13 ≥ ▲ PC 配 V V ≤	童鉤的條碼為:
20180707 排時段 Insulin detemir FlexPen 300u/3ml/pen	8 SC HS 圖 21 ≥ 意 (自)注意 (包)	第品資訊 國示 仿單
20180706 非時段PC Tolterodine L-tart. 4mg/cap NEW	1 PO QN 圖 18 ≥ / 勿座中 PC 配 V ≤ / 次座中 PC	PME062P
20180706 非時段 AC Gliclazide MR 60mg/tab	PO BID	商品名: Levemir FlexPen 排和
20180706 非時段 Neomycin & Tyrothricin oint 10gm/tube	1 TOPIBID ■ 18 09 ≥ QS ■ W V V ≤	空爾諾易筆 學名: Insulin 放大 放大
20180706 非時段PC Famotidine 20mg/tab REN	1 PO QD 圖 09 PC 配 V	detemir FlexPen
20180706 非時段PC Colchicine 0.5mg/tab REN	PO QD 圖 PO PC 配 V	300u/3ml/pen 副作用: 低血




給藥過程注射部位提示1-1




給藥過程注射部位提示1-2



給藥過程注射部位提示1-3



查閱血糖及胰島素注射紀錄1-1




查閱血糖及胰島素注射紀錄1-2

显		
病患基本資料	P-2-11/25	
姓	床號性別	÷
F/S與Insulin紀錄		•
1/051118018		返回
2018/07/06	2018/07/07	2018/07/08
F/S(共2筆)	F/S(共3筆)	F/S(共2筆)
05:13 F/S: 95mg/dL	05:20 F/S : 77mg/dL	05:29 F/S : 76mg/dL
09:55 F/S : 195mg/dL	09:58 F/S : 150mg/dL	10:06 F/S : 186mg/dL
Insulin(共1筆)	21:19 F/S : 140mg/dL	Insulin(共1筆)
21:34 Insulin detemir FlexPen 300u/3ml/pen 10UN SC HS	Insulin(共1筆)	21:17 Insulin detemir FlexPen 300u/3ml/pen 8UN SC
	21:21 Insulin detemir FlexPen 300u/3ml/pen 8UN SC HS	
		III •
参考值:≧ 18歳 AC:70~100 mg/dL,PC:70~140 m < 18歳 AC:60~100 mg/dL,PC:70~140 mg	g/dL /dL	^ ~


病房常備用藥

操作步驟:讀取護理站常備用藥使用記錄單上藥物條碼,系統自動比對正確性,確認無誤該藥物呈 現粉紅底色




病安通報—藥物事件

●已開封藥品怎又辦理退藥及退帳,為何?





材料編號。	藥品名稱。	商品名稱。	廠牌 。
PME114P	NovoMix 50 penfill (FlexPen)	NovoMix 50 諾和密斯	NOVO
	100U/ml,3ml/pc	50.	NORDISK.
PME056P	NovoMix 30 penfill(FlexPen)	NovoMix 30 諾和密斯	NOVO
	100U/ml,3ml/pc	30 諾易筆。	NORDISK.



材料編號。		藥品名稱	3	商品名稱。	廢牌。
PME044P	Insulin	glargine	(Lantus)	Lantus SoloStar 蘭德仕	Sanofi-Aven
	100iu/m	I,3ml/pen		注射劑。	tis Deuts



PME113P

Insulin GLULISINE (Apidra) 100IU/ml,3ml/pen.

Apidra Solostar 愛胰達 注射劑。

Sanofi-Aven



材料編號。		藥品名稱	j e	商、	品名稱。		廢牌。
PME088P	Humalog	Mix25,	100IU/ml,	Humalog	Mix25	Kwik	LILLY.
	3ml/pen₄			<u>Pen</u> ₊			
PME076P	Humalog	Mix50,	100IU/ml,	Humalog	Mix50	Kwik	ELI LILLY.
	3ml/pen₄			pen.			



PME107P

Insulin Lispro 100iu/ml,3ml/

penfill.

Humalog 優泌樂筆注射 劑 100U/ml KwikPen。

Lilly



材料編號。	藥品名稱	商品名稱。	廢牌。
PME062P	Insulin detemir 300u/3ml/3	Levemir FlexPen 瑞和	Novo
	填式注射筆。	密爾諾易筆。	Nordisk.



PME058P Insulin Aspart 100u/ml,3ml/pc

FlexPen

NovoRapid 諾和瑞 諾 易筆。

NOVO NORDISK



材料編號。	藥品名稱。	商品名稱。	廠牌。
PME110P	Liraglutide 6mg/ml,3ml/pen	Victoza 胰妥善注射液。	NOVO
			NORDISK.




病人衛教篇

衛教指導內涵

- ●認識自身使用藥品
- ●認識注射部位選擇
- ●注射後如何做登錄
- ●認識異常症狀及處理

胰島素抽取及注射衛教手冊



文章編號 00418 類別 技術類 閱讀次數 13999 QR-Code次數 132

上檔年度 2017 建議看診科別

建藏有衫科別 內分泌暨新陳代謝和



下載 列印

認識胰島素種類及作用

項次	種類/項目	起始時間	高峰時間	持續時間
1	超短效 Novo Rapid Pen	5~15 分	1~2 小時	3~4 小時
2	超短效 Insulin Lispro Pen	0~15 分	1 小時	4 小時
1	超短效 Insulin GLULISINE (Apidra) Pen	10 分	55 分	3~4.5 小時
4	短效 Actrapid HM	0.5~1 小時	2~3 小時	3~6 小時
5	中效 Insulatard HM	2~4 小時	6~10 小時	10~16 小時
6	超長效 Insulin glargine	1.3 小時	_	24 小時
I /	超長效 Insulin detemir Pen	1~2 小時	_	24 小時
8	混合型 Novo Mix 30 Pen (超短效 30% + 中效 70%) Novo Mix 50 Pen (超短效 50% + 中效 50%)	5~15 分鐘	1~2 小時	超短效:3~4 小時 中效:8~10 小時
1 0	混合型 Humalog Mix 25 Pen	0~15 分鐘	1小時	超短效:4 小時

一、胰島素筆型注射器抽取步驟



(1)用酒精棉片消毒橡膠處。



(2)將注射筆水平置於 手掌間滾動10次 ,再垂直180度上 下擺動10次。



(3)撕開針頭封條。



(4)垂直裝上針頭並鎖緊



(6)將劑量設定扭轉至 2單位,作為排出 空氣使用。



(7)拔去針頭內外蓋, 針頭朝上,設定鈕 按到底,排出注射 液。



(8)轉動劑量設定鈕至需注射的劑量位置。



(9)準備注射胰島素



二、胰島素筆型注射器注射步驟






- (1)用75%酒精棉枝或酒精棉片消毒注射部位,消毒方法:由中間向外環狀療拭,待消毒部位乾透,移除針頭外蓋及內蓋,準備打針。
- (2)注射部位:上手臂中段外側、大腿上段1/2外側、腹部(肚臍 周圍半徑5公分之外)與臀部(腸骨脊下緣10公分)。
- (3)若使用8mm筆型針頭需正確捏起皮膚將針頭以90度全插入皮膚(小孩或很瘦的人捏起皮膚以45度注射),若使用4mm筆型針頭則不需捏起皮膚將針頭以90度全插入皮膚。
- (4)將藥液緩緩注入完畢後,為了確認胰島素已完全進入皮下組織,至少需等待10秒,再拔出針頭。
- (5)注射完畢將筆型胰島素注射器拔除後,不需搓揉注射部位, 以棉球輕輕按壓注射部位5-8秒即可。

注射胰島素相關注意事項

肆、注射胰島素後注意事項

- 一、需觀察有無胰島素副作用的症狀出現
- (一)低血糖:應定期監測血糖,並依醫師指示執行注射時間及劑量, 配合飲食定時定量,預防低血糖發生。
- (二)胰島素過敏:雖有可能發生但是非常罕見,仍須觀察注射後皮膚有無出現皮膚紅疹、蕁麻疹或局部發癢情形。
- (三)脂肪萎縮:與胰島素品種及純度有關,使用人工基因合成的胰島素,已較少發生。
- (四)脂肪肥大增生症:可運用視診及觸診,評估注射部位有無不規則對稱或硬塊情形,應輪換注射部位,避免局部過度刺激。
- 二、高低血糖發生原因、症狀、預防處理方式
- (一)低血糖:通常血糖濃度低於 60~70mg/dL 會產生一些低血糖的症狀,有些病人血糖由高濃度急遽下降時,雖然血糖仍未過低,也可能產生低血糖症狀。
 - 1.發生原因
 - (1)未進食、延遲進食或吃得太少。
 - (2)過度激烈運動,未補充食物。
 - (3)胰島素或口服降血糖藥過量。
 - 2.可能症狀
 - (1)初期會有飢餓感、發抖、冒冷汗、心跳加快、無力或頭暈等症 狀。
 - (2)若不立刻服用含糖食物,甚至會意識不清、抽筋或昏迷等。
 - 3.處理方式

用藥安全醫療團隊及民眾共同參與





謝謝學聽